



Ñandú *una especie amenazada*

Nombre científico: *Rhea (Pterocnemia) pennata pennata*

Nombres vulgares: ñandú, choique, ñandú del sur

Es la mayor de las aves chilenas. Tiene un cuello largo y piernas largas. (largo total de 90 a 100 cm). Pesa entre 15 a 25 kilos entre los 6 y 12 meses de vida y puede vivir unos 15 años, aunque en cautiverio pueden vivir hasta unos 30 años. No hay diferencias sexuales externas entre macho y hembra, siendo solo reconocible el sexo por el comportamiento de apareamiento en primavera.



Distribución

Dos subespecies el suri o ñandú del norte *Rhea pennata tarapacensis* vive en el altiplano nortino y el choique o ñandú del sur *Rhea pennata pennata* que habita la patagonia oriental, en la estepa patagónica y precordillera Andina, en mesetas hasta a 2.000 m sobre el nivel del mar. En Chile se encuentra en Aysén con una distribución marginal y restringida actualmente sólo dos localidades, la Entrada Baker en el Valle de Chacabuco (comuna de Cochrane) y áreas cercanas a la estancia Baño Nuevo (comuna de Coyhaique), existiendo en el pasado en Balmaceda y Coyhaique Alto. También en la región de Magallanes.

¿Dónde vive?

Vive en la estepa patagónica en matorrales de estepas y prados de hierba "mallines" con matorrales malos. Prefiere zonas planas y lomajes suaves, con cuerpos de agua cercanos.




¿Qué come?

Es principalmente herbívora de arbustos y maleza pero puede comportarse como omnívora dependiendo de las condiciones del hábitat. Se alimenta de hojas de pastos y arbustos, y en menor medida semillas e invertebrados, comiendo grandes volúmenes para mantener su peso y estado sanitario. Suelen comer intensamente en zonas con pastos más verdes y tiernos donde el agua se mantiene en el suelo.



Reproducción

El período se inicia a mediados de otoño cuando los machos muestran conductas reproductivas (rezongos, vocalizaciones y conatos de pelea) y finaliza a fines de diciembre, según el clima. Las cópulas son en julio entre un macho y varias hembras (harem) y la postura de huevos es en nidos hechos en el suelo de agosto a diciembre.



El macho incubador por 37 a 41 días los huevos de 422 gramos promedio, escondiéndose entre la vegetación y defendiendo los huevos., los que rompen casi al mismo tiempo y el macho también cría los pichones, llamados **charitos**, los que aparecen desde el inicio de diciembre hasta enero. En esta época los depredadores más comunes son los zorros, el chingue y el peludo o armadillo.



Amenazas actuales

La caza furtiva y la colecta de huevos son las principales amenazas sobre las poblaciones, las que afectan las bajas densidades en Chile y el bajo éxito reproductivo. También son importantes los asentamientos humanos, los cercos y los caminos.

Protección legal

El ñandú está clasificado como Casi amenazada. Esta protegida por el Reglamento de la Ley de Caza estando sancionada la captura. Está protegida internacionalmente por la Convención de CITES, pero se permite la explotación comercial controlada.



Charito



Macho con charitos



Estudio de abundancia y factores de amenaza para la conservación del ñandú en la Región de Aysén (608897-24-lp16)
Programa FNDR Implementación Estrategia Regional de Biodiversidad, financiado por el Gobierno Regional de Aysén.
Mandante: Seremi Ministerio Medio Ambiente Región de Aysén. Ejecuta: Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA.
Fotografías: Heráldo Norambuena, Víctor Raimilla, Rocío Sanhueza, Rodrigo Santander, Marilyn González, Flavio Olivares, Enrique Zhielman, y Andrés Muñoz.

